

DGETS

IMSP AMT Centru

Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) ieri, azi și mâine

Mun Chișinău 23.06. 2020

Elena ROBU vicedirector AMMsIC IMSP AMT Centru

IERI - REZUMAT

- La 31 decembrie 2019 a fost raportată pentru prima dată la of.OMS,o pneumonie atipică, detectată la Wuhan, China.
- La 30 ianuarie 2020 a fost declarată o problemă de urgență în domeniul sănătății publice la nivel internațional.
- La 11 februarie 2020, OMS a anunțat numele pentru noua boală provocată de coronavirus - COVID-19, codul CIM - U07.1 caz confirmat și U07.2 caz suspect,
- La 11 martie 2020 OMS a anunțat faza de transmitere pandemică a infecției
- Zilnic OMS analizează datele, oferă consultanță, ajută țările să se pregătească, și să gestioneze situația de comun cu experții oficiilor de fiecare țară ,
- În perioada 17 martie -15 mai 2020 în RM a fost declarată Stare de urgență și instituit cod roșu la nivel național (29 de persoane infectate cu COVID-19),
- RM I caz la 7 martie 2020 - o femeie, revenită din Italia, în vârstă de 48 ani, la 16 martie 2020 sunt confirmate 23 de cazuri de infecție cu COVID-19 Azi – 22.06 – 14363 cazuri, inclusiv 2201 cazuri din sistemul de sănătate,
- Metodologia de supraveghere a maladiei (COVID-19) se actualizează periodic – ultima OMS 19.06.2020, al II PCN provizoriu 340 din 16.06.2020 in RM

Maladia Covid-19

Despre virus

În 2019, o serie de cazuri de pneumonie a apărut în Wuhan, China. Investigatiile au dus la descoperirea unui nou coronavirus. Coronavirusurile (CoV) sunt o familie numeroasă de virusuri.


COVID-19 este o tulpină nouă de coronavirus care provoacă boli ce variază de la răceala comună la boli mai severe.

Semnele comune de infecție includ simptome respiratorii, febră, tuse și dificultăți de respirație.

ORIGINILE VIRUSULUI

Majoritatea coronavirusurilor sunt zoonotice, ceea ce înseamnă că circula printre animale.

În general virusul respirator este transmis prin picături când o persoană infectată tușește, strănută sau atinge un obiect infectat.



TRATAMENT

Nu există niciun tratament curent sau vaccin împotriva noului coronavirus.


Prevenția este cheia pentru a împiedica răspândirea bolii.

Maladia Covid-19

Receptivitatea - este generală.

Perioada de incubație este de 2-14 zile
(în 95% între 4-7 zile).

Simptome



Transmitere





Virusul se raspandeste prin picaturi respiratorii.

Perioada de incubatie este estimata a fi între 2 si 14 zile.

**Absența febrei nu exclude infecția
COVID-19**

COVID19. LA CE DISTANȚĂ POT AJUNGE PARTICULELE RESPIRATORII?





References:

1. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Lauer SA et al. Ann Intern Med. 2020 Mar 10.
2. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand. Neil M Ferguson et al. Imperial College COVID-19 Response Team. 16 March 2020.
3. Viral dynamics in mild and severe cases of Covid-19. Yang Liu et al. The Lancet, March 19, 2020.



80%

80% dintre pacienții infectați cu COVID-19 se **însănătoșesc** fără complicații.

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății

1 din 5

Aproximativ în unul din cinci cazuri de îmbolnăvire este nevoie **spitalizarea**.

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății

1 din 6

În unul din șase cazuri de îmbolnăvire apar **complicații**.

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății

14 zile

Perioadă în care persoanele care se întorc din țările cu focar de COVID-19 trebuie să se autoizoleze în **carantină** la domiciliu.

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății



3,4%

Rata mortalității la nivel mondial a pacienților infectați de noul coronavirus este de cca 3.4%.

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății

tv8

În cele mai afectate județe din Ro s-au înregistrat creșteri ale mortalității de maximum 20-30%


Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA

- Rata de deces este de 12 ori mai mare pentru pacienții cu boli cronice care contactează noul coronavirus,
- Raportul a analizat 1,3 milioane de cazuri de coronavirus confirmate de laborator în Statele Unite în perioada 22 ianuarie – 31 mai.

Rata deceselor

OMS

COVID-19: Rata deceselor în Moldova la 12.06.2020
constituie **5,8%**



Rata de deces :


Covid 19 - 3,4 %

Gripa sezonieră - 1%
din cei infectați

R M la 22.06.20

Cazurile includ numai persoanele care au fost testate pozitiv. Regulile de testare și disponibilitatea testelor diferă de la o țară la alta. Numărul cazurilor este actualizat în permanență pe baza resurselor din întreaga lume. Rapoartele privind situația zilnică sunt disponibile și pe [site-ul Organizației Mondiale a Sănătății](#).

TOP-20 țări după cazurile noi înregistrate la data de 12.06.2020 (cazuri la un milion populație)



Sursa: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Notă: Pentru Moldova calculele sunt realizate la o populație de 4.034 mii, pentru a păstra comparabilitatea datelor. Conform BNS populația cu reședință obișnuită în Moldova este de 2.682 mii. Conform situației reale Moldova are nu 90,7, dar 136,4 cazuri noi înregistrate la un milion populație.

Date statistice în RM

Rata pacienților diagnosticați cu infecția COVID-19 în funcție de vârstă:

- 1-9 ani = 1,2%
- 10-19 ani = 1,2%
- 20-29 ani = 8%
- 30-70 ani = 87%
- peste 80 ani = 3%.

- Riscul de a dezvolta o infecție severă este mai mare pentru pacienții cu comorbidități precum:

- HTA - în 30.7%;
- DZ - în 14.3%;
- BCV - în 11.9%;
- Tumori maligne - 4.3%;
- Boli hepatice cr. - 2.8%;
- Boli br.-pulmonare cr. - 2.4%;



Dezinformări și falsuri despre coronavirus

- COVID-19 este adus de Armată cu un tren marfar,
- Elicopterele vor împrăști dezinfectant,
 - Bill Gates vrea să „cipeze” toți oamenii ca să controleze omenirea,
 - Termometrul electric și termoscanerul „marchează” oameni ,
Coronavirusul se transmite prin măști,
 - Microcipurile implantate sub piele au legătură cu virusul COVID-19 și cu tehnologia 5G,
 - **Se propun bani pentru ca acestea să semneze acte ce ar constata că decesul a fost provocat de noul tip de coronavirus,**
 - Tehnologia 5G a provocat răspândirea noului coronavirus, iar în Moldova sunt instalate antene 5G

Dezinformări și falsuri despre coronavirus

**STOP
FALS**

Teorii ale conspirației în legătură cu tehnologia 5G

Coronavirusul
a fost provocat
de tehnologia 5G



5G va activa bolile
cronice ale populației
globului

Pandemia a fost
inventată pentru a
instala antene 5G



Se pregătește
vaccinarea forțată prin
introducerea cipurilor



Virusurile sunt
o otrăvire
electromagnetică

5G

REȚELELE MOBILE 5G NU RĂSPÂNDESC COVID-19

Virusii nu
se răspândesc prin
unde radio
sau rețelele mobile.



Nu există nicio
legătură între răspândirea Coronavirusului și
rețelele 5G. În multe țări unde a apărut
virusul, nu există rețele 5G. Boala provocată
de COVID-19 este răspândită de persoanele
infectate prin strănut sau tuse.

Organizația Mondială a Sănătății

**STOP
FALS**

**Afirmații false, promovate de Thomas Cowan - un doctor SUA cu
licență suspendată**

Dezinformări și falsuri despre coronavirus



Florin Chilian este la Guvernul României.

12 iunie la 20:56 · București ·

Un document intern de 93 de pagini întocmit de mai mulți experți medicali externi, la comanda Ministerului de Interne de la Berlin, denunță măsurile adoptate de autoritățile germane împotriva noului coronavirus.

German Official Leaks Report Denouncing Corona as 'A Global False Alarm'
<https://www.globalresearch.ca/german-official-leaks.../5714528>

Cele mai controversate pasaje ale documentului vorbesc despre faptul că pericolul reprezentat de COVID-19 a fost supra-estimat, iar noul coronavirus nu depășește nivelul considerat normal în ceea ce privește amenințarea sănătății publice.

Guvernul federal german și mass media centrale de la Berlin încearcă să gestioneze un uriaș scandal, declanșat după publicarea pe căi neoficiale a unui raport întocmit de Ministerul de Interne german, în care se contestă retorica adoptată de autorități cu privire la epidemia de coronavirus.
<https://www.capital.ro/informatia-care-arunca-totul-in-aer-...>



CAPITAL.RO

Informația care aruncă totul în aer: Coronavirusul a fost o alarmă falsă globală

- **Pandemia de coronavirus este o alarmă falsă și că majoritatea celor care au murit oricum ar fi decedat din cauza comorbidităților**
- ultimul sondaj RM realizat pe 5-11 mai de CBS-AXA, arată că 33% din respondenți consideră coronavirusul un mit sau o minciună, în timp ce unul din doi moldoveni e de părere că virusul SARS-Cov-2 nu e mai periculos decât gripa și că totul este făcut intenționat pentru a distruge economia țării
- - sunt o manipulare
- goana după senzational,
- proteste nerespectarea măsurilor de distanțare,
- **Scopul** - submina încrederea cetățenilor în capacitatea guvernelor naționale de a face față crizei provocate de pandemia noului coronavirus.

Stephan Kohn – un politolog excentric

Surse de date actualizate privind infecția COVID-19

- Pagini web a autorităților naționale
 - MSMPS <https://msmps.gov.md/ro/content/coronavirus>
 - ANSP <https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/>
- Rețele sociale a autorităților naționale (facebook MSMPS, ANSP)
- Pagini web a OMS, ECDC
 - Organizația Mondială a Sănătății
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
 - Centrul European de Prevenire și Control a Bolilor
<https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Agencia Națională pentru Sănătate Publică

**Mesaje și
acțiuni
esențiale
privind
prevenirea și
controlul
COVID-19
în școli**

unicef



© UNICEF/UN220408/Pacific

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

GHID PRACTIC

Măsuri-cheie pentru
prevenirea infecției COVID-19
la locul de muncă



Chișinău, 2020

Legislație COVID-19

- **L E G E** privind regimul stării de urgență, de asediu și de război nr. 212-XV din 24.06.2004 (în vigoare 06.08.2004)
- **Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice**
- **Comisia națională extraordinară de sănătate publică Hotărîrea nr. 1 din 2 februarie 2020** „Privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire și răspuns “ - nr. 15 din 12 iunie 2020
- **Comisia pentru Situații Excepționale a R M DISPOZIȚIA nr. 1 din 18 martie 2020 - nr 30 din 15.05.2020**

CNESP nr. 15 din 12 iunie 2020

1. Recomandări conducătorilor unităților bugetare din subordinea Guvernului:
2. Se prelungește, până la 30 iunie 2020 sistarea activității taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor,
3. Se prelungește până la 30 iunie 2020 sistarea activității Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneosanatoriale, cu excepția Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii
4. Se reiterează interzicerea pînă la data de 30 iunie 2020 a aflării persoanelor:
 - în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane.
 - respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămîne obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice;
 - în vîrstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă;
 - pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

- Măsuri pentru autoritățile naționale
- Măsuri de carantină, sistarea activității instituțiilor de învățământ
- Restricții pentru călătoriile internaționale (companii aeriene, pasageri)
- Restricții privind organizarea manifestărilor publice cu mai mult de 50 persoane
- Sistarea activităților organizate în localuri de agrement, recreere, săli de sport, centre sportive, bazine de înot, săli de fitness, teatre, cinematografe, săli de concerte, muzee, și alte unități pentru antrenament și recreere
- Restricții pentru organizarea slujbelor religioase

MĂSURILE IMPLEMENTATE IN CLINICILE MEDICALE

- Consultațiile, investigațiile medicale se fac doar pe baza de programare
- Triaaj epidemiologic prin filtre telefonice si la intrarea in clinici
- Se primrsc Pacientii numai cu măști de protectie, se face termometria, se oferă pentru utilizare solutii dezinfectante.
- Exista circuite separate pentru pacienți și lucrători medicali
- Personalul medical si auxiliar este echipat corespunzator
- Toate spatiile sunt dezinfectate constant
- Recoltarea probelor pentru depistarea infectiei COVID-19 se face conform definiției de caz în zona roșie de către personalul medical echipat corespunzător și instruit anterior
- În caz de contact cu o persoană suspectă, personalul medical se autoizolează la domiciliu 14 zile și se monitorizează de către șeful de secție

COVID-19

PE DURATA STĂRII DE URGENȚĂ

INTERZIS

- **aflarea în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement**
- **ieșirea din casă, dacă sunteți izolat pentru 14 zile în carantină**
- **aflarea la distanță mai mică de 1 m față de alte persoane**
- **ieșirea în locuri publice, dacă vă simțiți rău sau aveți tuse, febră, nas curgător**

LIMITĂRI

- deplasarea în interes de serviciu, **dacă activitatea nu poate fi desfășurată de acasă**
- ieșiri **scurte doar la necesitate după produse alimentare sau medicamente.**
- deplasarea la medicul de familie, **dacă este strict necesar**
- ieșiri **scurte pentru necesități ale persoanelor și animalelor de companie** (în raza domiciliului)
- ieșiri din alte motive, **care nu pot fi amânate**, de exemplu, deces al unui membru de familie.

 **STĂM ACASĂ PENTRU CĂ NE PASĂ DE SĂNĂTATEA NOASTRĂ ȘI A CELOR DIN JUR!**

* Persoana care nu respectă restricțiile impuse în perioada de criză, se sancționează.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,
MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

GRUPUL NAȚIONAL DE COMUNICARE

În această perioadă este **ESENȚIAL** să evitați contactul cu alte persoane și vizitele la medic, vizite care pot fi amânate sau efectuate telefonic.



PENTRU ORICE VIZITĂ LA MEDICUL DE FAMILIE ESTE INDICATĂ O PROGRAMARE TELEFONICĂ!



Dacă aveți **ORICARE** dintre aceste simptome:

- febră
- dureri musculare
- orice simptome respiratorii: tuse, dificultăți la respirație etc.
- stare generală modificată

sau **dacă:**



- ați avut contact cu o persoană diagnosticată sau suspectă că ar avea COVID-19
- ați avut contact cu o persoană cu infecție respiratorie acută



**VĂ RUGĂM SĂ SUNAȚI MEDICUL DE FAMILIE!
NU VĂ DUCEȚI LA CABINETUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE
ȘI NICI LA SPITAL!
Există risc de infectare!**

Vi se vor pune câteva întrebări și vi se vor oferi informații despre ce trebuie să faceți în continuare. Acest lucru va ajuta la protejarea sănătății și siguranței dumneavoastră, a familiei și a celorlalți din jurul dumneavoastră.

Fiecare dintre noi este responsabil pentru el însuși și pentru cei din jur!

Vă mulțumim pentru că respectați regulile generale de protecție pentru prevenirea COVID-19!

PCN 370 DEFINIȚII DE CAZ

Caz suspect

- Pacient cu infecție respiratorie acută (febră **ȘI/SAU** cel puțin un semn/simptom al bolii respiratorii, de exemplu: tuse, dificultăți de respirație etc.) **ȘI** cu un istoric de călătorie sau aflare într-un teritoriu care raportează transmiterea infecției COVID-19 în ultimele 14 zile anterioare debutului simptomelor

SAU

- Pacient cu infecție respiratorie acută (febră **ȘI/SAU** cel puțin un semn/simptom al bolii respiratorii, de exemplu: tuse, dificultăți de respirație etc.) **ȘI** care a fost în contact cu un caz COVID-19 probabil sau confirmat (vezi definiția contactului*) în ultimele 14 zile înainte de debutul simptomelor;

SAU

- Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI**) **ȘI** care necesită spitalizare **ȘI** fără altă etiologie care ar explica pe deplin prezentarea clinică.

Caz probabil

- **A.** Un caz suspect pentru care testarea la infecția COVID-19 nu este concludentă.

SAU

- **B.** Un caz suspect pentru care testarea nu a putut fi efectuată din anumite motive.

PCN 370 Definiția contactului

- Persoana care a avut oricare contact cu un caz probabil sau confirmat pe parcursul a 2 zile până la debut și 14 zile după debutul simptomelor, precum:
 - - Contactul față în față cu un caz probabil sau confirmat la distanța de 1 metru și în decurs de mai mult de 15 minute;
 - - Contact fizic direct cu un caz probabil sau confirmat;
 - - Îngrijirea unui pacient cu COVID-19 caz probabil sau confirmat, fără a utiliza adecvat echipamentul de protecție personală

PCN 370 INFECȚIA CU CORONAVIRUS DE TIP NOU(COVID-19)

- Consultul telefonic al cazurilor suspecte de către medicul de familie.
- Identificarea pacienților care întrunesc criteriile definiției de caz.
- Aprecierea necesității internării în IMSP sau alte locații de izolare, cât și, în funcție de evoluția epidemiologică a infecției COVID-19, identificarea persoanelor care pot fi încadrate în tratament la domiciliu.
- Apelarea Serviciului 112 în caz de necesitatea internării pacienților sau/și acordării asistenței medicale de urgență prespitalicească
- Completarea **Anchetei epidemiologice**
- Informarea echipelor mobile de prelevare a probelor biologice referitor la suspecții care pot fi încadrați în tratament la domiciliu.
- Prelevarea testelor de control persoanelor cu forme ușoare a infecției COVID-19, încadrate în tratament la domiciliu, nu mai devreme de 12-14 zile de la debutul bolii.
- În cazul rezultatului pozitiv, repetarea testelor de control peste 7 zile.
- Obținerea rezultatelor negative la testele de control
- Aprecierea criteriilor de revenire în câmpul muncii.
- Respectarea condițiilor de izolare la domiciliu pentru o perioadă de 2 săptămâni după test negativ, inclusiv după externare (Caseta 8).
- Finalizarea supravegherii prin consultul medicului de familie cu eliberarea certificatului medical la necesitate.

Materiale pentru comunicare

- Recomandări generale pentru prevenirea infectării cu COVID-19
- Recomandări de prevenire a bolii în contextul călătoriilor internaționale
- Recomandări pentru persoanele în vârstă și persoanele cu boli cronice
- Măsurile la revenirea persoanei din zonele de risc
- Autoizolarea la domiciliu
- Cum îi protejăm pe cei din jurul nostru (eticheta tusei și strănutului, reguli de spălare/dezinfectare a mâinilor)
- Recomandări de prevenire a bolii la locul de muncă (crearea condițiilor de respectare a igienei/dezinfecției mâinilor, etichetei tuse, curățarea suprafețelor, lucrul la distanță, concediu de boală, respectarea recomandărilor autorităților de sănătate în cazul deplasărilor de serviciu)
- Reguli de utilizare a măștii (cine, când, cum)
- Mituri (afectarea animalelor de companie; transmiterea prin colete; utilizarea antibioticelor, preparatelor antivirale antigripale, altor vaccinuri sau remediilor naturiste;

PERMANENT

- 1 Difuzarea informațiilor cu privire la reducerea riscului de transmitere**
- 2 Autoizolarea și automonitorizarea la întoarcerea din zonă cu transmitere locală/comunitară extinsă sau contact cu persoane suspecte/confirmate cu COVID-19**
 - efectuarea termometriei de 3 ori pe zi și informarea zilnică, prin telefon, a medicului de familie despre rezultatele acestora 14 zile;
 - În caz de apariție a simptomelor clinice de COVID-19 se va apela telefonic medicul de familie sau în caz de urgență - Serviciul 112.
- 3 Respectarea strictă a Măsurilor de igienă generală, respiratorie, a Tehnicilor de dezinfecție a mâinilor, suprafețelor**

Ce măsuri de igienă individuală trebuie să respecte persoanele autoizolate?

MC

- Să evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuință și, dacă este posibil, să se izoleze într-o cameră separată.
- Să NU primească vizitatori în perioada de autoizolare la domiciliu.
- Să se spele pe mâini cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde, ori de câte ori este necesar (după utilizarea toaletei, înaintea pregătirii mesei, etc).
- Să curățe și să dezinfecteze zilnic toate suprafețele pe care le ating frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse și de alte persoane).
- Să își acopere gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau cu o țesătură atunci când strănută sau tușesc, sau să strănute și să tușească în plica cotului. Batista se aruncă imediat la coșul de gunoi, în sac de plastic, după care se spală pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde.
- Să aerisească cât mai bine toate încăperile casei. Spațiile comune ale casei (bucătărie, baie) trebuie să fie bine aerisite!
- Să țină legătura zilnic cu medicul de familie și să-l informeze asupra evoluției tuturor membrilor familiei.
- Să sune la numărul unic de urgență 112 în cazul în care apare cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultăți la respirație, durere în gât – să își acopere nasul și gura cu o mască de protecție.

Protocol ?Curățarea și dezinfectarea suprafețelor


- suprafețele mobilierului și alte obiecte fixe (de ex. mese, scaune, pereți, întrerupătoare, periferice de computer), precum și la suprafețele de echipamente medicale necritice (echipamente care intră în contact doar cu pielea intactă, cum ar fi manșetele de măsurare a tensiunii, scaune rulante, incubatoare) – se curăță frecvent cu apă și detergent, urmată de aplicarea unui dezinfectant. *Printre cei mai obișnuiți dezinfectanți folosiți care s-au dovedit a fi eficienți împotriva SARS-CoV-2 se numără: etanolul 70-90%, soluții pe bază de clor (de exemplu, hipoclorit) cu concentrație de la 0,1% (1000 ppm) pentru dezinfectarea generală a mediului sau de 0,5% (5000 ppm) pentru obiectele contaminate cu sânge și cu alte fluide corporale, sau cu peroxid de hidrogen >0,5%5-6 . Durata minimă recomandată pentru expunerea suprafeței la acești dezinfectanți este de un minut1 sau în conformitate cu instrucțiunile producătorului.*
- În unitățile ne-sanitare, suprafețele includ mobilier și alte obiecte fixe, cum ar fi blaturi, balustrade, precum și podele și pereți. Dezinfectanții ar trebui aplicați pe suprafețele atinse frecvent pentru a reduce contaminarea potențială cu virusul SARS-CoV-2 în locațiile comunitare, unde riscul de contaminare nu este cunoscut (de exemplu, săli de sport, birouri, restaurante, unități de cazare), precum și în gospodării și unități ne-tradiționale unde sunt cazate persoane bolnave sau suspecte de COVID-19.
- Pulverizarea suprafețelor cu dezinfectanți nu va fi eficientă și poate dăuna persoanelor. Pulverizarea spațiilor exterioare (cum ar fi străzi, terene de joacă, trotuare,) nu este recomandată pentru a elimina sau a inactiva SARS-CoV-2 sau alți agenți patogeni.
- Efectul toxic al pulverizării de substanțe chimice, cum ar fi clorul, pe persoane, poate duce la iritații la nivelul ochilor și pielii, bronhospasm cauzat de inhalare și efecte potențiale gastrointestinale, cum ar fi greața și vomă9-1

Protejați-vă angajații. Fiți pregătiți !

MC

- **Distribuirea materialelor informative și instruirea privitor la :**
 - importanța, utilizarea adecvată a echipamentului personal de protecție,
 - identificarea simptomelor unei posibile infecții COVID-19 și oferă măști medicale suspectilor ,
 - cunoaște definiția de caz și Izolează cu promptitudine un caz suspect,
 - realizează în mod frecvent igiena mâinilor,
 - utilizarea soluțiilor dezinfectante pentru mâini și spații pentru spălat, pentru personalul medical, educatori, bucătari și copii

Cum și când să folosiți o mască medicală în timpul COVID-19



POARTĂ MASCĂ

CUM SĂ PORȚI O MASCĂ MEDICALĂ ÎN SIGURANȚĂ

AȘA NU →



Nu folosi o mască ruptă sau umedă



Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie



Nu purta o mască prea largă



Nu atinge partea din față a măștii



Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măștii



Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane




Nu refolosi masca

Reține: doar măștile nu te pot proteja de COVID-19. Păstrează distanța de cel puțin 1 metru față de ceilalți și spală-te des și bine pe mâini, chiar și când porți mască.

AI GRIJĂ! OPREȘTE RĂSPÂNDIREA COVID-19.

SALVEAZĂ VIETI


COVID-19 MASCA TREBUIE PURTATĂ:



ÎN TRANSPORTUL
PUBLIC



SPAȚIILE PUBLICE ÎNCHISE
(MAGAZINE, CENTRE
COMERCIALE)



ÎN SITUAȚIILE ÎN CARE NU POATE
FI RESPECTATĂ DISTANȚA
SOCIALĂ DE CEL PUȚIN 1 M



**MASCA TREBUIE SĂ ACOPERE
ATÂT GURA, CÂT ȘI NASUL.**

RM risc înalt de infectare cu virusul SARS-CoV-2

- Peste 50 de persoane nou infectate la 100.000 de locuitori în ultimele 7 zile.
- numărul total de infecții și tipul de focar (local limitat sau extins), capacitățile de testare ale țărilor, precum și testele efectuate per număr de locuitori, precum și măsurile luate în state pentru a încetini procesul de infectare (reglementări de igienă, urmărirea contactelor etc.).

AZI

- Virusul SARS-CoV2, responsabil pentru boala COVID-19, are o sumedenie de efecte secundare grave, care abia sunt cuantificate.
- Răspândirea virusului este mult mai mare decât cea din statisticile oficiale
- La moment, nu există un vaccin eficient pentru profilaxia specifică.
- Nu se cunoaște durata imunității în COVID-19, dar în infecțiile cauzate de alte coronavirusuri imunitatea nu este de durată,
- Fiecare țară duce Evidența și raportează cazurile suspecte și confirmate de COVID-19
- Se menține un nivel ridicat incidență/cazuri noi și crește numărul de cazuri grave
- Risc crescut de suprasolicitare a sistemului medical

AZI Infectii cu coronavirus (COVID-19) – 28.06.2020 ora 9:00

La nivel mondial

**peste - 10.000.000
de persoane
contaminate** oficial
(probabil de încă de
10 ori în realitate,
adică 100 de
milioane de oameni)
**- 500.000 de
persoane
decedate care au
avut și Covid-19..**

RM TOTAL

**16259 - cazuri
confirmate**

- **9081– recuperate**
- **127 – suspecte**
- **530 - decese**
- **27688 – cazuri
monitorizate**

- <http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b>

Recomandări OMS azi


- Pentru o bună sănătate emoțională preveniți stresul! Reduceți timpul alocat știrilor despre pandemie! Faceți alte activități care vă plac!
- Pentru o bună sănătate fizică, efectuați zilnic, cel puțin 30 minute de activitate fizică pentru adulți și cel puțin o oră pentru copii!
- Consumați zilnic alimente proaspete, variate, de sezon, pentru a asigura aportul de nutrienți de care are nevoie organismul dvs.!
- Respectați regulile generale de igienă când pregătiți alimentele pentru consum și asigurați igiena adecvată a echipamentelor, suprafețelor de lucru și ustensilelor de bucătărie.
- Folosiți doar produsele personale de igienă, precum prosoape sau lenjerii, obiectele cu care mâncați.
- Nu folosiți în interiorul locuinței încălțăminte și îmbrăcăminte cu care ați circulat în afara casei.
- La intrarea în locuință, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun
- Aerisiți frecvent încăperile în care lucrați sau locuința
- **Mentineți distanța socială (minimum 1 m) față de persoanele din jur din jur.**

Masuri de prevenire si raspandire a virusului la grădiniță

- Spalati des mainile folosind apa si sapun sau solutie alcoolica de curatat pe maini
- Acoperiti gura si nasul cu o masca medicala, batista sau folositi pliarea cotului atunci cand tusiti sau stranutati. După spalati mainile cu apă și săpun.
- Evitați să va atingeți fața, nasul, gura sau pielea capului
- Evitati pe cat e posibil contactul cu colegii: strangere de mana, imbratisare, pupat
- Aerisire periodică zilnic. Virusul se poate transmite aerogen.
- Evitati să utilizați aceeași veselă cu cineva, pahare si alte obiecte de uz casnic
- Curatati si dezinfectati suprafetele pe care le atingi adesea, precum tastaturile, mouse-ul sau telefoanele mobile. Astfel, riscul de infectare poate fi diminuat semnificativ.
- La primele simptome de boală stați acasa si apoi contactati medicul de familie
- Consumati alimente bine preparate termic (in special carnea , etc)

Mâine

- Elaborarea unor măsuri logistice / proceduri standartizate, foarte bine sistematizate referitor la programul de lucru, nr de copii in grupe, primirea copiilor dimineata, identificarea, monitorizarea și prevenirea cazurilor de îmbolnăvire, vârsta angajaților, etc.,
- Un sistem de comunicare între grădiniță, familie și autorități bine sistematizat pentru monitorizarea cazurilor de îmbolnăvire, autoizolarea contactilor în caz de suspecție (personalul , copiii din instituție),
- Materiale informative pentru cadrele didactice din grădiniță, pentru părinți, pentru copii



**Să evităm locurile
aglomerate !**

**Să purtăm masca în
spațiile închise !**

**Să ne spălăm des
mâinile !**

Mâine

1. Formarea microgrupurilor cu stabilirea unui număr de copii ce revin la un educator în creșe și în grădinițe (6 – 10?)
2. Limitarea numărului de jucării,
3. Limitarea interacțiunii acestor microgrupuri, la terenurile de joacă
4. Respectarea strictă a Regulilor generale de igienă,
5. Activitatea copiilor în spații exterioare conform unui orar
6. Aerisire frecventă
7. Siguranța alimentației
8. **Menținerea distanței sociale /fizică**
9. **Suplinirea numărului de angajați**
10. Efectuarea zilnică a controlului din partea administrației – ANSP - ANSA

ACORDUL PĂRINTELUI

Subsemnatul/amama / tatăl copilului

Vă aduc la cunoștință **pe proprie răspundere**, copilul meu suferă în prezent sau a suferit în trecut de una din următoarele afecțiuni: otită, dificultăți auditive vizuale....., dificultăți de vorbire , dificultăți de adaptare , alergii (medicamente, alimente, înțepături insecte , etc.), diabet....., tuberculoză....., boli respiratorii (bronșite, astmă, amigdalite), boli digestive (hepatită)....., boli urogenitale....., boli endocrine, alte

..... Enumerați
medicamentele luate regulat de copilul dumneavoastră și motivele pentru care i le administrați:

.....
.....
.....
.....

Acord permisiunea cadrelor medicale din gradinița/ școală să acorde asistență medicală copilului în cazuri de extrema urgență, dacă nu pot fi contactat(a) imediat. Eu sau persoana de contact, împluternicesc, de asemenea, conducerea institutiei și cadrele didactice să întreprindă toate măsurile necesare posibile în vederea supravegherii și transportării copilului până la cea mai apropiată unitate spitalicească da / nu

Mă oblig să prezint la intrarea în colectivitate un aviz epidemiologic, de la medicul de familie, indiferent de motivul absentării, în cazul absenței lui mai mult de 3 zile consecutiv.

Mă oblig să anunț asistenta medicală despre apariția unei boli contagioase, diagnosticate de către un medic.

Semnătura părintelui Data

Concluzie

- 1 Criteriul de bază pentru redeschiderea grădinițelor va fi situația epidemiologică
- 2 Redeschiderea grădinițelor va fi, cred ca numai după efectuarea unui calcul matematic între oportunitatea economică - riscurile sanitare - posibilitățile sistemului educațional preșcolar, de comun cu MSMPS
- 3 Împreună trebuie să facem față cu bine “necunoscutului” și știu că așa va fi și în continuare.

**Mulțumesc pentru
atenție**



**Oriunde ai fi in
aceasta lume
ai grija de tine!**

